

La T° : les précautions à prendre (2.5 pts)

2/

3/

4/

5/

Q5/ Relier par une flèche (4.5 pts)

Pouls carotidien		face interne du poignet, entre le tendon fléchisseur radial du carpe et le radius
Pouls radial		se situe au niveau du cou en dessous de la trachée sous l'angle maxillaire.
Pouls humérale		se situe au niveau du tendon du biceps un peu au-dessus du pli du coude.
Pouls fémoral		se situe dans le sillon inguinal (pli de l'aîne) entre l'os du pubis et l'os iliaque
Pouls pédieux		se situe sur la face dorsale du pied dans le prolongement du tibia.
Pouls poplité		se situe dans le creux poplité : face postérieure du genou
Pouls tibial postérieur		se situe en arrière de la malléole interne au niveau de la cheville.
Pouls abdominal		se situe à l'arcade sourcilière près de l'œil
Pouls temporal		se situe juste au-dessus de l'ombilic.

Q6/ Remplir ce tableau (03 pts)

Pression artérielle : Norme OMS chez l'adulte > 18 ans		
Classification	Pression systolique (mmHg)	Pression diastolique (mmHg)
Pression artérielle optimale		
Pression artérielle normale		
Pression artérielle normale haute		
Degré 1 HTA légère		
Degré 2 HTA modérée		
Degré 3 HTA sévère		

BON COURAGE